

対象者の皆様へ

子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症)予防接種のお知らせ 【キャッチアップ接種】

1 キャッチアップ接種対象年齢と接種期間

接種対象:平成9年4月2日から平成20年4月1生まれの女性

接種期間:令和7年3月31日まで

2【新規】キャッチアップ経過措置について

2024年夏以降の大幅な需要増により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方に向け、2025年3月末までに接種を完了した方が、全3回の接種を公費(無料)で完了できるようになりました。公費による接種を希望する方は、1回目接種を令和7年3月末までに行うことを検討してください。

※経過措置期間は、お手元の予診票を引き続き利用できます。

接種対象:令和4年4月1日から令和7年3月31日までの期間中に少なくとも1回以上接種した方

※令和7年度は平成20年4月2日から平成21年4月1生まれの女性も対象

接種期間:令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

3 定期接種の対象ワクチン【厚生労働省作成「大切なお知らせ」をご覧ください】

- ・2価ワクチン(サーバリックス)・・・16型、18型ウイルスの感染を予防するワクチン
- ・4価ワクチン(ガーダシル)・・・16型、18型および6型、11型ウイルスの感染を予防するワクチン
- ・9価ワクチン(シルガード9)・・・16型、18型および6型、11型、31型、33型、45型、52型、58型ウイルスの感染を予防するワクチン

※原則、同じワクチンを合計2～3回接種することとなっています。

4 子宮頸がん と HPV ワクチンの効果【厚生労働省作成「詳細版リーフレット P2～4」をご覧ください】

子宮頸がんは、ヒトパピローマウイルス(HPV)というウイルスの持続的な感染が原因となって発症します。子宮頸がんHPVの子宮頸部(子宮の入り口付近)への感染はほとんどが性交渉によりますが、このウイルスに感染すること自体は決して特別なことではなく、誰でも感染する可能性があります。

子宮頸がんの発症は20代以降に多く、HPVに感染してもほとんどの場合は自然に排除されますが、ウイルスが排除されず長期間感染が続く場合があり、ごく一部のケースで数年から数十年かけ、子宮頸がんを発症します。

定期接種の対象年齢である16歳頃までにワクチンを接種するのが最も効果が高いとされていますが、それ以上の年齢で接種しても、ある程度の有効性があることが、国内外の研究で示されています。

5 HPV ワクチンのリスク【厚生労働省作成「詳細版リーフレット P5」をご覧ください】

多くの方に、接種部位の痛みや腫れ、赤みなどが起こることがあります。

重い副反応としては、まれに、呼吸困難やじんましん等(アナフィラキシー)、手足の力が入りにくい(ギラン・バレー症候群)、頭痛・嘔吐、意識低下(急性散在性脳脊髄炎(ADEM))等が起こることがあります。

(裏面もご覧ください)

6 接種場所

HPV 予防接種実施医療機関で接種してください。

対象の医療機関は、下記の二次元コードからアクセスして区ホームページを確認してください。

※大田区以外の22区の医療機関でも接種できる場合がありますので、直接、当該区か医療機関にお問い合わせください。

7 接種費用

予防接種予診票を使用し、キャッチアップ接種対象年齢(表面1)の期間内に接種を受けたときは無料です。ただし、HPV 予防接種実施医療機関以外での接種は有料となりますのでご注意ください。

8 接種する際の持ち物

予防接種予診票、母子健康手帳(お手元にある方)

※原則、保護者の同伴が必要ですが、接種する方が13歳以上であれば予診票に保護者自らが署名することで保護者が同伴しなくても接種することができるようになりました。

9 予防接種の注意事項 *必ずお読みください

<予防接種を受けられない方>

- ① 明らかに発熱している方(37.5℃以上)
- ② 重篤な急性疾患にかかっている方
- ③ 予防接種やそれに含まれる成分でアナフィラキシーを起こしたことがある方
- ④ その他、医師が予防接種を受けるのに不適切な状態と判断した方

<予防接種前に医師と相談しなければならない方>

- ① 血小板が減少している、出血した際に止まりにくいなどの症状のある方
- ② 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害などの基礎疾患のある方
- ③ 過去に予防接種で接種後2日以内に発熱がみられた方
- ④ 過去にけいれん(ひきつけ)をおこしたことがある方
- ⑤ 妊娠又は妊娠している可能性のある方
- ⑥ ワクチンを接種した後や、けがの後等に原因不明の痛みが続いたことがある方

<接種後の注意事項>【詳しくは同封の厚生労働省作成「HPV ワクチンを受けた方へ」をご覧ください】

- ① 痛みや緊張等によって接種後に一時的に失神や立ちくらみ等が生じることがあります。接種後30分程度は安静にしてください。
- ② 接種を受けた日は、激しい運動は控えましょう。
- ③ 接種後に体調の変化があった場合、接種を受けた医師にご相談ください。

10 強い副反応が生じた場合【厚生労働省作成「詳細版リーフレット P6」をご覧ください】

医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が残るなどの副反応が生じた場合、その副反応が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、健康被害救済(医療費・障害年金等)の給付対象となります。

11 自費で接種した方に対する費用助成(償還払い)について

定期接種の対象年齢(小学6年生～高校1年生)を過ぎて自費で接種した方に対して、費用助成を行います。詳細については、区ホームページをご確認願います。

12 大田区ホームページ

二次元コードからアクセスするか、「大田区 HPV」で検索し、ご覧ください。

